

VİT HALİS®
Ruhsatlı BKÜ
No. 13049
12.03.2024

Kokarca

Halyomorpha halys
kahverengi feromonu

- Türkiye'de ilk ruhsatlı kokarca feromonu
- 12 hafta boyunca etkili
- %100 etkili

Kahverengi kokarca, başta fındık olmak üzere elma, armut, turuncgiller, şeftali, ceviz, Trabzon hurması, mısır, fasulye, domates, biber, patlıcan ve kivi gibi birçok tarım ürününde zarar yapar. Sokucu-emici ağız yapısıyla bitkilerin meyve ve yapraklarını delerek beslenir. Bu beslenme sonucunda önce küçük nekrotik (ölü doku) lekeler oluşur; ancak asıl zarar, meyvelerin olgunlaşma döneminde şekil bozuklukları ve pazar değerinin düşmesiyle kendini gösterir.



Yumurtalar ve nimfler
© Eziözcü



Elmadaki zarar
© Rob Morrison, PP-D.



Domatesteki zarar
© Steve Schodt, NCSU



Fındıktaki zarar
© Thomas Molnar, Assoc. Prof.

Kullanımı

Feromon içeren tuzakları, böceklerin tahmini uçuş döneminden önce kurunuz. Tuzakları, meyve bahçeleri ve üzüm bağlarının sınır hattındaki direklerle veya konukçu olmayan ağaçlara, yaklaşık 50 metre aralıklarla yerleştiriniz.

Feromon dispenserlerini (yeşil ve siyah poşetler) kesmeyin, delmeyin veya yırtmayın.

Yeşil ve siyah dispenserleri **birbirinden ayırmadan**, üzerlerindeki deliklerden yararlanarak doğrudan tuzığa yerleştiriniz veya sabitleyiniz.

İzleme / Monitör
Hektara 1-4 adet

Kitlesel
Hektara 4+ adet



Uygun Tuzak Tipleri

Funnel (Huni) tipi tuzaklar, kahverengi kokarcanın yakalanmasında en sık kullanılan yöntemlerden biridir. Feromonla böceği çeker, huni yapısıyla yakalar ve alt haznede biriktirir. Yoğunluk takibi ve kitlesel yakalama için etkilidir. Bölgeye ve amaca uygun farklı tuzak türleri de kullanılabilir. Hangi tip tercih edilirse edilsin, düzenli kontrol ve bakım şarttır.



Yapışkan tuzaklar



Damacana veya plastik şişelerle yapılan tuzaklar



Funnel (Huni) tipi tuzaklar



www.vit-verim.com

Verim İnşaat ve Turizm Ltd. Şti.
Kâtip Mustafa Çelebi Mah. Abdullah sk. 3/2
34433 Beyoğlu, İstanbul
Tel : (0212) 251 70 45-46
Faks : (0212) 251 70 47

www.verim.biz

www.verimgrup.com

